

תרחיש 1 – אירוע ירי

#	הפציעה	דינמיות במהלך התרחיש
1	ירי במצח – פגיעת ראש	ירי ברור במצח, סימני פגיעת ראש, מעורפל הכרה/מגיב לכאב. <u>במהלך התרחיש</u> : מתדרדר עד לחוסר הכרה
5	ירי בחזה – חזה אוויר בלחץ	מצוקה נשימתית קשה, סימני הלם <u>במהלך התרחיש</u> : מצוקה נשימתית מתגברת, המצב משתפר רק לאחר ניקוז אוויר כירורגי (ALS)
7	ירי בבית השחי – חזה אוויר בלחץ	מצוקה נשימתית, סימני הלם <u>במהלך התרחיש</u> : מצוקה נשימתית מתגברת, משתפר בהנחת אשרמן במידה ובוצע תוך 15 דקות. לאחר 15 – משתפר בניקוז אוויר ע"י מחט (ALS)
8	ירי כניסה עורף יציאה בית שחי – חזה אוויר בלחץ	מצוקה נשימתית מחריפה, סימני הלם. <u>במהלך התרחיש</u> : מצוקה נשימתית מתגברת, משתפר בהנחת אשרמן במידה ובוצע תוך 25 דקות. לאחר 25 – משתפר בניקוז אוויר ע"י מחט (ALS)
9	ירי בחזה ובבטן – פגיעה ריאתית + דימום פנימי, הלם	מצוקה נשימתית וסימני הלם. <u>במהלך התרחיש</u> : אם לא פונה – התדרדרות כללית במצב כולל ירידה במצב הכרה, איבוד הכרה ומוות מדימום פנימי תוך 30 דק'
11	ירי בבטן – דימום פנימי, הלם	סימני הלם <u>במהלך התרחיש</u> : אם לא פונה – התדרדרות כללית במצב כולל ירידה במצב הכרה, איבוד הכרה ומוות מדימום פנימי תוך 30 דק'
12	ירי במותן – דימום פנימי, הלם	סימני הלם <u>במהלך התרחיש</u> : אם לא פונה – התדרדרות כללית במצב כולל ירידה במצב הכרה, איבוד הכרה ומוות מדימום פנימי תוך 30 דק'
14	ירי בירך – דימום פנימי, הלם	סימני הלם <u>במהלך התרחיש</u> : אם לא פונה – התדרדרות כללית במצב כולל ירידה במצב הכרה, איבוד הכרה ומוות מדימום פנימי תוך 30 דק'
16	ירי בחזה – חזה אוויר פשוט	קוצר נשימה קל/בינוני <u>במהלך התרחיש</u> : ללא שינוי
18	ירי כניסה בחזה יציאה בית שחי – חזה אוויר פשוט	קוצר נשימה קל/בינוני <u>במהלך התרחיש</u> : ללא שינוי
19	ירי בקו בית השחי – חזה אוויר פשוט	קוצר נשימה קל/בינוני <u>במהלך התרחיש</u> : ללא שינוי

#	הפגיעה	דינמיות במהלך התרחיש
20	ירי בכתף/זרוע עליונה – דימום חזק*	דימום חיצוני מתמשך מפצע ירי בכתף/זרוע. <u>במהלך התרחיש</u> : אם הדימום לא נעצר על ידי לחץ ישיר מתאים, עם הזמן התדרדרות כללית עד לאיבוד הכרה.
22	ירי בעורף – פגיעה ריאתית קלה	קוצר נשימה קל <u>במהלך התרחיש</u> : ללא שינוי
23	ירי בירך – דימום חיצוני חזק*	דימום חיצוני מתמשך מפצע ירי בירך. <u>במהלך התרחיש</u> : אם הדימום לא נעצר על ידי לחץ ישיר מתאים, עם הזמן התדרדרות כללית עד לאיבוד הכרה.
34	נפגעי חרדה	נפגעי חרדה – מאפייני הפגיעה לפי בחירת הנפג"מ: 34א : צועק, בוכה, ניגש למטפלים, במצוקה ניכרת או 34ב : שקט, מופנים, סימני נתק, תגובה מינימלית למטפלים ולסביבה
35	ירי בכתף – חשד לפגיעה ריאתית קלה	קוצר נשימה קל, ללא סימני היפוקסיה <u>במהלך התרחיש</u> : ללא שינוי.
36	ירי בכתף – פגיעה עצבית	סימני פגיעה עצבית בגפה ממקום הפגיעה. <u>במהלך התרחיש</u> : ללא שינוי.
40	ירי בזרוע עליונה - שטחי	כאב מקומי, דימום קל, ללא סימנים נוספים. <u>במהלך התרחיש</u> : ללא שינוי.
42	ירי בכתף - שטחי	כאב מקומי, דימום קל, ללא סימנים נוספים. <u>במהלך התרחיש</u> : ללא שינוי.
43	ירי באמה - שטחי	כאב מקומי, דימום קל, ללא סימנים נוספים. <u>במהלך התרחיש</u> : ללא שינוי.
90	פצע עמוק ופתוח בכתף – דימום ממוקד פנימי	פצע עמוק ומדמם שניתן לעצור רק בטכניקת wound packing. <u>במהלך התרחיש</u> : התפתחות סימני הלם כולל ירידה ברמת הכרה, במידה והדימום נעצר ביעילות – התייצבות בנקודה זו (ללא שיפור אך ללא החמרה בשטח)
100	בהיריון, ירי בחזה - חזה אוויר פשוט, מצוקה עוברית	קוצר נשימה קל. ירידה בתנועות עובר. <u>במהלך התרחיש</u> : ללא שינוי במצב הנשימה. ירידה בתנועות עובר וחשד להתפתחות צירים.

מספר נפג"מים בתרחיש זה: 24

צור קשר לפרטים נוספים ולהזמנת תרגיל: info@simedic.co.il